

Kazuistika na VF Veterycin gel

Nationale : fena KČŠK kastrovaná po operaci LCC věk 6 let. Standardní operační výkon, ortopedická noxa dle věku a stavu pacienta . 10 den po operaci ex stehy a následovná dehiscence partiální, rány (susp .zpomalená tvorba keloidní jizvy) majitel automutilaci vylučuje pro použití límce

První den: stav dehiscence a sekrece v miliárním stylu po stezích , provedena toaleta a sanace doma majitelem Betadina + řepík v ordinaci doporučena aplikace VF gel Veterycin bez aplikace Betadina (první aplikace po důkladné laváži fyziol. roztok za účelem odstranění předchozích desin.prostředků a zbytky sol. Noviko) foto č.1



1. druhý den stav výrazné zklidnění rány aplikace jen gel toaleta 3x denně (majitel popisuje výzané zesvětlení snížení sekrece , spolu se snížením potřeby automutilace foto č.2



2. den 4 . stav výrazného zklidnění , bez projevů exudace a sekrece , návrat ke stavu sanace per primam pos operativa ,okolí rány velmi uspokojivé , hodnoceno nejen z pozice ošetežujícího lékaře ale i majitele . Foto 3



Zhodnocení : velmi dobrá sanční schopnost s eliminací komplikujících faktorů zhoršující hojení, svědivost , sekrece a hojení typem kolagen keloid .Za pozitivní hodnotí majitel akceptaci zvířetem , bez potřeby automutilace , pohodlnost aplikace a ošetřování , stejně tak rychlost a viditelné pozitivní změny rány hodnotí majitel velmi kladně .